

АЛЬГОПИКС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: *действующие вещества:* 100 г жидкости содержат дегтя можжевельного 0,5 г, экстракта зеленых микроводорослей спиртового (1: 7) 3 г, салициловой кислоты 1 г

Вспомогательные вещества: гелевая основа, натрия хлорид, эссенция Альгопикс, вода очищенная.

Лекарственная форма: Жидкость для наружного применения.

Фармакологическая группа: Дерматологические средства.

Показания: Как вспомогательный и профилактическое средство при жирной и сухой себорее. В комплексном лечении себорейного дерматита и отрубевидного лишая с повреждением волосистого покрова головы.

Противопоказания: Повышенная чувствительность (аллергия) к компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности: Препарат не должен применяться в случаях нарушения целостности кожи, слизистых оболочек глаз и полости рта. При попадании жидкости в глаза могут наблюдаться слезотечение, покраснение конъюнктивы и жжение. При покраснении кожи после применения препарата, появления зуда или жжение, необходимо прекратить, поскольку, возможно, эти симптомы являются проявлением аллергической реакции.

Применять внимательно при бронхиальной астме, поскольку содержит салициловую кислоту. Избегать воздействия солнечного света в течение 24 часов после применения препарата.

Может привести к изменению цвета волос у людей с белокурыми, осветленным или окрашенным волосам (из-за содержания дегтя).

Применение в период беременности или кормления грудью.

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и кормления грудью

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Дети. Препарат нельзя применять в детском возрасте, поскольку отсутствуют данные об эффективности и безопасности его применения у детей.

Способ применения и дозы: Применяется для обработки волосистой части головы. 15 - 30 г препарата (1-2 столовые ложки) наносятся на предварительно увлажненные волосы и с помощью втирания достигается полное покрытие волос и кожи головы пеной. Нанесена жидкость остается на 5 - 10 мин с целью лучшего проникновения в слои кожного покрова, после чего смывается большим количеством воды. Рекомендуется трехразовое применение препарата в течение 1-2 недель.

Во избежание рецидивов частота применения после достижения лечебного эффекта - 1-2 раза в неделю. Частота применения и длительность лечения зависят от вида заболевания и его тяжести.

Передозировка: При правильном применении передозировки препарата невозможно. При случайном поглощении жидкости может наблюдаться повышенное слюноотделение, тошнота и рвота. В подобных случаях необходимо обильное промывание полости рта и желудка, а при необходимости применения симптоматических средств. При случайном или ошибочном применении препарата на больших участках тела возможно появление системных эффектов - головной боли, головокружения, шума в ушах.

Побочные эффекты: Нежелательные реакции, связанные с применением, единичны. Иногда на месте применения могут наблюдаться аллергические реакции в виде покраснения, зуда и жжения. Длительное применение препарата может привести к чрезмерному высушиванию кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Может применяться одновременно с другими лекарственными средствами для местного применения (вкл. ГКС). Он не должен применяться одновременно с косметическими препаратами, сильно высушивают кожу, и во время ультрафиолетового облучения.

Условия хранения: Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.

После вскрытия флакона срок хранения до 30 дней.

САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.